

Rondeller med popler

Poplerne er skæve mange af dem, og de hælder meget til siden. Det skyldes primært mosegrise, der har gnavet rødderne, samt vinden.

Som enkeltstående træer, er de ikke pæne, men samlet udgør de en fin enhed, og rondellerne har karakter.

I bunden af rondellerne ser man selvforyngelse, idet der vokser selvsåede træer og buske frem. Blandt andet eg, tjørn, birk mirabelle, ask og nogle buske. Der er også stødskud fra de popler, der blev fjernet ved den seneste udttynding af træerne. Der er tidligere blevet skåret ned, men det er senest gjort omkring 2015.

Langsigtet mål

Den fremtidige pleje skal sigte imod at bevare de nye selvsåede træer og buske. Når de bliver større og får mere magt, kan man fjerne poplerne enten helt eller gradvis. Udfordringen er, at poplerne giver stødskud, når de bliver skåret ned. Derfor skal de nye træer først få lov at komme op og få mere magt, før poplerne fjernes.

Tiltag

2020: Stødskud omkring nye små træer fjernes, for at give plads og lys til de nye træer.

To "forkerte" popler i en af rondellerne fjernes.

2023: Om tre år tilses rondellerne igen med henblik på at vurdere forholdet mellem selvforyngelsen og de gamle popler.



Figur 1 Rondel med gamle skæve popler og selvforyngelse



Figur 2 Rondel med gamle skæve popler og selvforryngelse





Figur 3 Rondel med især birkeopvækst og to "forkerte" popler.



Felter med balsampopler – Sydvestligt

Poplerne er nu omkring 25 år gamle og er blevet meget høje. De står aflange i rombe-felter. Træerne tættest på boligkvarteret er vokset mest. Deres grenen generer grundejerforeningens grønne område og de træer, de har plantet langs vejen.

Der er selvfor yngelse mellem poplerne. Det er små træer og buske så som eg, tjørn, mirabelle, ask og nogle buske. Der er også stødskud fra de popler, der blev fjernet ved den seneste udtynding af træerne. Det er tidligere blevet skåret ned, men det er senest gjort omkring 2015. Busklaget fungerer som afskærmning mellem højmarksvejen og boligkvarteret.

Langsigtet mål

Den fremtidige pleje skal sigte imod at bevare de nye selvsåede træer og buske. Når de bliver større og får mere magt, kan man fjerne poplerne enten helt eller gradvis. Udfordringen er, at poplerne giver stødskud, når de bliver skåret ned. Derfor skal de nye træer først få lov at komme op og få mere magt, før poplerne fjernes.

Tiltag

2020: De yderste popler over mod boligkvarteret fjernes, så der ikke er træer der generer grundejerforeningens rønnetræer. Stødskud der generer selvfor yngelsen fjernes. Dog ikke mere grundigt, end at der stadig er et relativt tæt busklag, der kan afskærme ud mod højmarksvejen.

Langs cykelstien på højmarksvejen stammes poplerne op, så grenen ikke generer ud over cykelstien.

2023: Om tre år tilses felterne igen med henblik på at vurdere forholdet mellem selvfor yngelsen og de store popler.



Figur 4 Poplerne er ca. 25 år gamle og er blevet meget høje





Figur 5 Poplerne langs cykelstien stammes op, så grene ikke generer ud over cykelstien



Figur 6 De yderste popler ind mod boligkvarteret fjernes



Figur 7 Skråning hvor der tidligere er fjernet nogle popler. Foruden stødskud er der selvforyngelse i form af eg og hassel

Række med søjleformede popler

En lang række med søjleformede popler, har set bedre dage, rent biologisk. Rigtig mange af træerne ser sølle ud, især på midterstykket, hvor de er væsentlig mindre og har færre blade. Selve træerne har ikke meget værdi, men som en samlet helhed har de en strukturel og fin form, som vi ønsker at bevare stadigvæk.

I bunden af rækken er der selvfor yngelse i form af blandt andet egetræer, mirabelle og ribsbuske. Det er lidt spredt, og der er ingen selvfor yngelse på midten, hvor også træerne mistrives mest.

Græsklipperen kører meget tæt på træerne.

Langsigtet mål

Selvfor yngelsen skal få lov til at vokse op og få plads, så de på sigt kan afløse poplerne og bliver en ny varieret træerække, med fuldkronede træer og buske.

Tiltag

2020: Vi kan evt. supplere selvfor yngelsen i træerækken, så det er mere jævnt fordelt. Spredde agern eller plante småplanter ud.

Øge afstanden fra træerækken til græsklipperen, så der bliver mere plads til de små nye træer og buske.

2023: Gennemgang om tre år med henblik på at vurdere forholdet mellem selvfor yngelsen og de gamle popler. Vurdere om poplerne stadig skal blive stående og om der skal plantes efter i rækken med forskellige nye små træer.



Figur 8 Række med søjleformede popler. Klipperen kører tæt på. Selvforyngelse med eg

Felter med balsampopler – Nordøstlig

Felterne består af store balsampopler og med nogen selvfor yngelse i bunden. Her er en del ær, som er blevet spredt fra naboarealerne. Der er også eg og tjørn, men eg primært på den lysfyldte sydside. Der er også glansbladet hæg.

Poplerne generer ikke naboerne.

Langsigtet mål

Den fremtidige pleje skal sigte imod at de nye selvsåede træer og buske erstatter de store popler. Dog skal aggressive arter som ær og glansbladet hæg holdes nede.

Tiltag

2020: Ikke fastlagt

2023: Om tre år tilses felterne igen med henblik på at vurdere forholdet mellem selvfor yngelsen og de store popler.